

Hovedspørgsmål

Gastrointestinal blødning

- 55-årig mand indbringes bevidstløs af Falck til skadestuen efter at være fundet af hustruen på badeværelsesgulvet i hjemmet. På skadestuen findes han somnolent, bleg, klamtsvedende, tachycard med puls på 150/min og blodtryk 85/50 mm Hg. Dele af ansigt og overkrop er delvist indsmurt i frisk og gammelt blod og Falck-personalet angiver, at der i ambulancen har været opkast af frisk blod.

Beskriv retningslinierne for diagnostik og behandling af ovenstående patient.

- Redegør kort for symptomerne ved gastrointestinal blødning
- Nævn de hyppigste årsager til gastrointestinal blødning og angiv omtrentlige hyppigheder
- Beskriv de prognostiske faktorer ved øvre gastrointestinal blødning
- Beskriv prioritering og udredning ved øvre gastrointestinal blødning
- Redegør kort for behandlingen af de hyppigste årsager til øvre gastrointestinal blødning

Bispørgsmål

1.

Beskriv inddelingen af de periinguinale hernier og redegør kort for den objektive undersøgelse ved disse.

2.

Angiv de to hyppigste årsager til væskespejl i en sinus paranasalis, set på røntgenundersøgelse af ansigtsskraniet, CT eller MRI.

3.

Kræft, der optræder i glandula thyreoidea

- Angiv hvilke primære former der findes.
- Redegør kort for den overordnede behandlingsstrategi ved den hyppigste af disse former.

•

4.

Du bliver tilkaldt til opvågnings afdelingen. En patient, der lige er kommet tilbage fra operationsstuen efter en transuretral resektion af prostata i generel anæstesi, er konfus, har synsforstyrrelser, opkastninger, kulderystelser, højt blodtryk og tachycardi. Temperaturen er 38.2.

- Angiv de 2 umiddelbart mest oplagte årsager hertil.
- Hvilke blodprøver vil du få foretaget akut?

5.

Definér venøs insufficiens på underekstremiteterne og angiv hvad man forstår ved a) dyb venøs insufficiens og b) overfladisk venøs insufficiens.

6.

Ved øjenundersøgelse af en 39-årig, tidligere rask kvinde, finder øjenlægen inkomplet bitemporal hemianopsi. Visus 6/6 ou. Menstruationer regelmæssig, ingen P-piller.

- Skitser udredningen af denne patient.
- Angiv og overvej nærliggende diagnose og differentialdiagnoser.

7.

Angiv behandlingen af en voksen patient med anafylaktisk shock.

8.

Forreste skulderluksation

- Beskriv tre hyppigt anvendte metoder til reposition
- Angiv hvilke komplikationer der ses ved denne luksation.

9.

Redegør for, hvordan man klinisk vurderer peritoneal reaktion.

10.

Aortadissektion

- Redegør for symptomerne ved aortadissektion,
- Angiv, hvilke typer der findes
- Redegør kort for behandlingen af disse.